



## കാലാവസ്ഥാ മുന്നിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: : 20.08.2024 മുതൽ 24.08.2024 വരെ)



## കാസറഗോഡ് ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക റവേഷണ കേന്ദ്രം  
പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുറത്തിറക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിന്നന്പൾ: പിലിക്കോട്/കെ.എസ്.ഡി. - 67/2024

തീയതി: 19/08/2024

എ.പിനിട അഞ്ച് ഭിവസതെത കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കൂടിയ താപനില, °C	കുറവെത താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഡത, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
3.0	28.5 – 32.0	24.5 – 25.5	82 – 96	00 – 01

ബി.വരുനാഞ്ചിവസങ്ങളിലേക്കുള്ളകാലാവസ്ഥാ മുന്നിയിപ്പ്

സൂചിക	20-08-2024	21-08-2024	22-08-2024	23-08-2024	24-08-2024
ശരാഖരിമഴ, മി.മീ	5	2	7	3	2
കൂടിയതാപനില, °C	32	32	32	32	32
കുറവെതതാപനില, °C	26	26	26	26	26
കൂടിയആപേക്ഷികആർഡത, %	90	90	95	90	90
കുറവെതആപേക്ഷികആർഡത, %	80	75	75	75	75
കാറിന്റെവേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	10	5	10	15	13
കാറിന്റെഡിശ, ഡിഗ്രി	290	250	180	210	210
മേഘവിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	8	8	8	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	അടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷികനിർദ്ദേശങ്ങൾ
ശക്തികുറവെത മഴ **			
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ	ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഡത അനുഭവവെച്ചും. ആകാശം പുർണ്ണമായും മേഘാവൃതമായിരിക്കും. അന്തരീക്ഷ ഉഷ്ണാവ് സ്വാധാരണയിൽ കുറവായിരിക്കും. ആഗസ്റ്റ് 19 മുതൽ 23 വരെ ശക്തികുറവെത മഴ (ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറിൽ 15.6 മില്ലിമുതൽ 64.4 മില്ലി വരെ)		

<p><u>പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ</u></p>	<p>കഴിഞ്ഞ തിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിൽ അമീതമായി വെള്ളക്കെടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നീർ വാർച്ച അനുവദിക്കുക വിത്ത്, റബ്രൂ, കശുവണ്ടി, മത്തൻ, കൊപ്പ ഉല്പന്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വെയിലത്തിട്ടുണ്ടാക്കുക. മുട്ടു കാണ്യ വിളകളായ വാഴ, പച്ചക്കറികൾ, താങ്ങുകൾ ആവശ്യമുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തമായ താങ്ങുകൾ നൽകുക. വളം, വിത്ത്, കാലിത്തീറകൾ എന്നിവ ഇന്ത്യൻ തട്ടാത്തതും കീടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ മുൻകളിൽ ഉയർത്തിക്കെട്ടി പലക പാകിയ പ്രതലങ്ങളിൽ മേൽ സുക്ഷിക്കുക. കനുകാലികളെ ബലകഷയമുള്ള തൊഴുത്തുകളിൽ പാർപ്പിക്കരുത്. ഉരുൾപെട്ടിനും, മണിക്കൂർപ്പിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജീനങ്ങൾ അടുത്തുള്ള സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അവശ്യ ഘടങ്ങളിൽ മഴയില്ലാത്ത ഇടവേളകൾ ലഭിക്കുന്നോൾ മാത്രം പശ ചേർത്തു കീടനാശിനി തളിക്കുക.</p>		
<p>നെല്ല്</p>	<p>വിവിധ ഘട്ടം</p>	<p>കരിച്ചൽ/ചീച്ചൽ രോഗം</p>	<p>മുൻകരുതലായി സ്റ്റിച്ചിങ് പദ്ധതി (എക്കറിന് 2 കിലോ) സുഷിരങ്ങളുള്ള കിഴികളിലിംഗം വെള്ളം കണ്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക</p>
<p>നെല്ല്</p>	<p>വിവിധ ഘട്ടം</p>	<p>ഓലചുരുട്ടിപുഴു</p> 	<p>ഓലചുരുട്ടിപുഴുആക്രമണം ഉണ്ടാക്കിയിൽക്കൂടുള്ള സുവലിച്ചുജാലപുരുളുകൾ തുറക്കുക. ആക്രമണംരൂക്ഷമാണെങ്കിൽ മാത്രം പ്ലാവാൻ ദൈ അമേമഡ് 39.35% SC @ 1 മീറ്റർ/10 ദിവസം വെള്ളത്തിൽ എന്നതോതിൽക്കലർത്തിത്തിൽ ഇച്ചുകാടുക്കുക.</p>
<p>തെങ്ങ്/</p>	<p>തെതകൾ</p>	<p>വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ/കുന്നു ചീയൽ</p>	<p>തെതകുളികളിൽ വെള്ളംകെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. കുഴികളിലേക്കു വെള്ളം പിഡ്ചിരങ്ങാതിരിക്കാൻ കുഴികൾ ചുറ്റും വരന്ന് നിർമ്മിക്കുക. മഴയുടെ ഇടവേളയിൽ 1 % വോർഡോക്ക് മിശ്രിതം ഹലക്കളിലും കുന്നിലും പശ ചേർത്ത് തളിക്കുക.</p>
<p>തെങ്ങ്</p>	<p>വിവിധ ഘട്ടം</p>	<p>കുന്നു ചീയൽ</p> 	<p>കുന്നുചീയൽ ഉണ്ടായാൽ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രോഗം ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ചെത്തിമാറ്റി നശിപ്പിക്കുകയും മുൻവിൽ വോഡോ കുഴിക്കു പുരട്ടുകയും ചെയ്യുക. തുടർന്ന് പുതുനാമ്പു വരുന്നത് വരെ കുന്നിനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കടലാസുപയോഗിച്ചു പൊതിഞ്ഞു മറ്റ് വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ സംരക്ഷിക്കുക. സമീപത്തുള്ള തെങ്ങുകളുടെ കുരുതോലക്കും ചുറ്റുമുള്ള ലൈക്കളിലും ഒരു ശതമാനം വീരമുള്ള വോഡോ മിശ്രിതം തളിക്കുക. ദുർബല മേഖലകളിൽ, തെങ്ങുകളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉയർത്താൻ സുക്ഷ്മ മുലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്ര പോഷക മുലക പരിപാലനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.</p>

കുരുമുള്ള്	വിവിധ ഘട്ടം	ചീച്ചൽ രോഗം	<p>ചീച്ചൽ രോഗം : മുൻകരുതലായി ടെട്ടേക്കോഡർമ സസ്യച്ചുമാക്കിയ വേപ്പിൾ പിന്നോക്ക്-ചാണക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വിത്തം തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി ചേർത്തിളക്കുക.</p> <p>രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ണു തുടങ്ങിയാൽ രേഖാചിത്രം രെബു ശാം ഒരു ലിറ്റർ വൈളള്ടതിൽ എന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മണ്ണ് കുതിർക്കുക. ഇലകളിൽ ചീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക.</p>
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം (നേന്തൻ വാഴ)	കടചീയൽ	<p>മുൻകരുതലായിന്ന് ടെട്ടേക്കോഡർമ സസ്യഭോഗിയായി പോരാട്ടിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കോപ രഹസ്യഭോഗിക്കുന്നതിൽ എന്ന് വാഴതടത്തിൽ കുതിർക്കുക</p>
ഇന്തി	വിവിധ ഘട്ടം	വാട്ടം	<p>രു സെസ്റ്റിന് മുന്നുകിലോ വിത്തം കുമ്മായം മണ്ണിൽ ചേർത്തിളക്കുക. ടെട്ടേക്കോഡർമ, സസ്യഭോഗിയാണെന്ന് എന്ന് ജീവാണുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.</p> <p>രോഗം വന്ന ചെടികൾ പിചുതുമാറ്റി രുശതമാനം വിരുമുള്ള വോദ്ദോമിശ്രിതം കൊണ്ട് തടം കുതിർക്കുക.</p>
വെണ്ണ	വിവിധ ഘട്ടം	തണ്ണുതുരപ്പൻ	<p>വേപ്പേള്ള മിശ്രിതം 5 ശതമാനം 15 ഓ 20 ദിവസം ഇടവേളകളിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കീറാൽപ്പോസ് 2 മില്ലി രു 10 ലിറ്റർ വൈളള്ടതിൽ കലക്കി തളിക്കുക</p>
വിളകളും വളർത്തു മുഗങ്ങളും	വിവിധ ഘട്ടം	ആഫ്രിക്കൻ ചെ	<p>ചെുകളെ ആകർഷിച്ചു പിടിക്കുവാനായി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നന്നായി ചെന്ന ചാക്കുകളിൽ കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ, പപ്പായ എന്നിവയുടെ ഇലകൾ നിറച്ചു വീടിനു ചുറ്റും വെക്കുക. ഇവയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചെുകളെ 200 ഗ്രാം ഉപു രുശലിറ്റർ വൈളള്ടതിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തയ്യാറാക്കിയ ലായനിയിൽ ഇടു നശിപ്പിക്കുക.</p> <p>വിളകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെുകളെ നശിപ്പിക്കാനായി 0.3 ശതമാനം വിരുമുള്ള തുരിൾ (3 ഗ്രാം കോപർ സൾഫോറ്റ് രു 1 ലിറ്റർ വൈളള്ടിൽ) ലായനി തളിക്കുക. തുരിൾ ലായനിയുടെ വിരും യാതാരു കാരണവശാലും അധികരിക്കരുത്. അധികാരിച്ചാൽ വിളകൾക്ക് പൊളിളും ക്ഷീണവും ഉണ്ടാകും.</p>

പൾ	വിവിധാല്പട്ടം	<p>പ്രസാദ, വായ് രോഗം</p>  	<p>അപ്പത്തോന്തെവറിസ് അണുബാധ മുലമുണ്ടാകുന്ന വളരെയേറെ പകരുന്ന രോഗമാണ് കാൽ, വായ് രോഗം.</p> <p>അണുബാധയുടെ ഫലമായി വായിലും ചുറ്റുപാടും കാലുകളിലും വെസിക്കുലാർ നിവേദ് ഉണ്ടാകുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി രൂമുശം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ നീങ്ങാനോ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു.</p> <p><b>പ്രതിരോധം:</b> വ്യക്തിഗത മുഗങ്ങൾക്കും അവയുടെ പാർഷിടത്തിനും ചുറ്റുപാടുകൾക്കും ശുചിത്വ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക. ഹൈത്തിൽ ടോൺിക്കുകൾ അടങ്കിയ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുകളും അടങ്കിയ തീറ്റകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് കനുകാലികളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. രോഗം വന്നാൽ ഉടൻ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മരുന്ന് നൽകുക.</p>
കോഴി	വിവിധ അല്പട്ടം	അണുബാധ	<p>കുടുകളുടെ തരയിൽ ഇഞ്ചപം നിലനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇഞ്ചപം നിലനിന്നാൽ തരയിൽ വീഴുന്ന കാഷ്ടത്തിൽ നിന്നും അമോൺഡ് വാതകം പുരുത്തെങ്കു വമിക്കും.. അത് കോഴികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ പ്രതികുലമായി ബാധിക്കും.</p>

ഒപ്പ്/-  
 നോഡൽ ഓഫീസർ  
 ഗ്രാമീണ കൃഷികാലാവസ്ഥാസ്വപ്നഭവതി

താക്കിൽ (ഇടഞ്ഞന്തപട്ടിയെടുക്കുക)	ജാഗ്രത (തയ്യാറാവുക)	ശ്രദ്ധ (കാതോർക്കുക)	നിസ്സാരം (നടപടികൾആവശ്യമില്ല)
-------------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------

\*\*മഴ അപായ വർഷ സുചന (ദുരന്തനിവാരണത്തിനായ്)



