



കാലാവസ്ഥാ മുന്നിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: 22.05.2024 മുതൽ 26.05.2024വരെ)



മലപ്പറമ്പ് ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻസ്: പിലിക്കോട്/എം.പി.പ്പി - 41/2024

തീയതി: 21/05/2024

എ.പി.ഒ. അഞ്ച് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കൂടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഡത, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
99.7	26.5 – 33.5	23.8 – 26.2	73 – 98	00 – 12

ബി.വരുനാഞ്ചേർഡിവസങ്ങളിലേക്കുള്ളകാലാവസ്ഥാ മുന്നിയിപ്പ്

സൂചിക	22-05-2024	23-05-2024	24-05-2024	25-05-2024	26-05-2024
ശരാശരിമഴ, മി.മീ	15	8	60	15	8
കൂടിയതാപനില, °C	27	27	27	27	27
കുറഞ്ഞതാപനില, °C	24	24	24	24	24
കൂടിയആപേക്ഷിക ആർഡത, %	98	98	98	98	98
കുറഞ്ഞആപേക്ഷിക ആർഡത, %	78	78	78	78	78
കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	2	8	4	4	4
കാറിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	180	160	340	320	290
മേഘവിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	8	8	8	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	അവഭാവം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷികനിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ		രൂപേട്ട ശക്തിയായ മഴ **	രൂപേട്ട അതിശക്തിയായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പകൽസമയങ്ങളിൽ കൂടിയ ഉഖ്താവും രാത്രികളിൽ കുറഞ്ഞ താപനിലയും ആകാശം ഭാഗികമായോ മുഴുവനായോ മേഘാവൃതമായിരിക്കും. വായു ഇന്റർപ്പം കുറഞ്ഞതു വരണ്ടതായിരിക്കും. മെയ് 21നും, 22നും രൂപേട്ട ശക്തിയായ മഴ (ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമുതൽ 115.5 മില്ലി വരെ) മെയ് 23 മുതൽ 25 വരെ ശക്തികുറഞ്ഞ മഴ (ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറിൽ 15.6 മില്ലിമുതൽ 64.4 മില്ലി വരെ)

<p><u>പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ</u></p>	<p>റൂപേഴ്സ് ശക്തിയായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. മഴക്കുഴികളിൽ തൃപ്പന്നു പോയവ വീണ്ടെടുക്കുക. വിളകളുടെ തട്ടൽത്തിൽ കർത്തിലകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതയിടുക. വൃക്ഷ വിളകൾക്ക് വളം ചേർത്തതിന് ശേഷം മുഴുവനായും മുടാത്ത തടങ്ങൾ നാലു ജലസംഭരണികൾ കൂടിയാണ്. പറമ്പിൽ ഒപ്പിച്ചു പോകുന്ന വൈളം ചാലുകൾ എടുത്തു ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കൊപ്പ, കശുവണ്ടി, വിത്തുകൾ റബർ എന്നിവ വൈയിലാത്തിട്ടു വൈയിലാത്തിട്ടു ഉണക്കുന്നോ ജാഗ്രത വേണം. നേന്ത്രൻ വാഴയ്ക്ക് താങ്ങുകൾ നൽകുക.</p>		
<p>നെല്ല്: വിരുപ്പു (നന്നാം വിള)</p>	<p>നിലമൊരുക്കൽ</p>	<p>മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാടം ഉഴുതൽ ആരംഭിക്കുക. ആദ്യത്തെ ഉഴുതലിൽ തന്നെ പച്ചില വളങ്ങൾ, ഉണക്കിപൊടിച്ച ചാണക വളം എന്നിവ (മൊത്തത്തിൽ ഷൈക്കറിനു അഞ്ചു ടൺ നിരക്കിൽ) മണ്ണുമായി ചേർക്കുക.</p>	
<p>തെങ്ങ്</p>	<p>വിവിധ ഘട്ടം</p>	<p>കൊന്പൻ ചെല്ലി</p>  <p>ഉയരം കുറഞ്ഞ തെങ്ങുകൾ പൊതുവെ കുടുതൽ ആക്രമണ വിധേയരാണ്</p>	<p>തെങ്ങിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുനിന്നും ചെല്ലിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് വളങ്ങുകളെ കുത്തിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക. ഫോർഡോ കുഴിപ്പ് കൊണ്ട് വണ്ണുകൾ തുരന്ന ദ്വാരം നിരക്കുന്നത് മുൻവിൽ കൂടി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പുഷ്ട ബാധയെ തടയാൻ സഹായിക്കും.</p> <p>ഉപയോഗ സുന്ധായ മീൻ വലകൾ ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിലും അര മീറ്റർ വീതിയിലും മുൻവിച്ചുത്തു തെങ്ങിന്റെ മുന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ലെക്കവീളുകളിൽ വിരിച്ചു നടുഭാഗത്തു ചെറുക്കല്ലുകൾ വച്ച് ഉൾഭാഗത്തെക്കു തള്ളി അമർത്തി വെക്കുക. ഓലത്തണ്ടിന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തെക്കും പുരോതേക്കു തുണ്ടി നിൽക്കുന്ന വലയുടെ വശങ്ങൾ നന്നായി വിടർന്നിരിക്കണം. പാറിവരുന്ന വണ്ണുകൾ കാലുകൾ വലയിൽ കുടുണ്ടി സഖ്യരിക്കാൻ പ്രാതേ നശിച്ചു പോകും, പുതു ഓലകൾ വിടരുന്നതിനുസരിച്ച് വലമുകളിലോട് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.</p>

തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	<p style="text-align: center;">കുന്നപ്പീയൽ</p> 	<p>വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം മുൻകരുതലായി ഓരോ തെങ്ങിന്റെയും കുമ്പിനു ചുറ്റും കവിളിൽ ദൈനക്കോശയർമ കെള്ള് നിക്ഷേപിക്കുക.</p> <p style="text-align: right;">അമ്പുകിൽ</p> <p>മാക്കോസേബ് നിറച്ച, സുംശിരങ്ങൾ ഈട ചെറു പോളിത്തിൻ പാകരുകൾ (2 ഗ്രാം) തയ്യാറാക്കുക. തെങ്ങിന്റെ മണ്ഡ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം, മുൻകരുതലായി, ഇങ്ങനെന്നയുള്ള മുന്നു പാകരു് വിതം ഓരോ തെങ്ങിന്റെയും കുമ്പിനു ചുറ്റും കവിളിൽ വയ്ക്കുക.</p> <p style="text-align: right;">അമ്പുകിൽ</p> <p>തെങ്ങിന്റെ മണ്ഡയിലും, കുമ്പിലും, മുൻകരുതലായി, 1% വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിക്കുക. 1% വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിക്കുക.</p>
കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	<p style="text-align: center;">വാട രോഗം</p> 	<p>വാട രോഗത്തിനെന്തിരെ മുൻകരുതലായി ദൈനക്കോശയർമ സംസ്ക്രഷ്മാക്കിയ ഭേദപിന്ന പിള്ളാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വിതം തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി ചേർത്തിളക്കുക.</p>
കശുമാവ്	വിളവെടുപ്പ് ഘട്ടം	<p style="text-align: center;">തട്ടിതുരപ്പൻ</p> 	<p>താഴുട്ടികളിലും പുറമെ കാണുന്ന വേരുകളിലും കാർബോസൾഫാൻ 3 മിലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലായനി പുരട്ടുകയും മണ്ണിൽ ശൈഖ്ര് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.</p> <p>5 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പ്രായമായ മരങ്ങളാണെങ്കിൽ ചെളി : ടാർ - മരണ്ണവൂ മിശ്രിതം (1:2അനുപാതത്തിൽ) മുൻകരുതലായി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.</p> <p>മണ്ണിനു വെളിയിൽ കാണുന്ന വേരുകൾ മണ്ണിൽ മുടുക.</p>

കവുങ്ങ്	കായ്ക്കുന്ന ഘട്ടം	മഹാജി 	രു ശതമാനം വീരമുള്ള ബോർഡേയാ മിശ്രിതം കുപകളിലും ഇപകളിലും തളിച്ച് കൊടുക്കുക.
കോഴികളും വളർത്തു പക്ഷികളും	വിവിധ ഘട്ടം	വേനൽക്കാലപിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണമെന്നും രോഗങ്ങളും : 	അന്തരീക്ഷ ഉഷ്ണവോർ വർദ്ധിക്കുന്നത് വളർത്തു കോഴികളെയും പക്ഷികളെയും പ്രതിക്രൂലമായി ബാധിക്കും. പ്രതിക്രൂലും സാഹചര്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി പക്ഷികളെ സുരൂരൂപിക്കശ്രീ ഏൽക്കാത്ത വൈഴളും പെയിൻ്റ് അടിച്ച മേൽക്കുരകൾക്ക് താഴെ പാർപ്പിക്കുക. ഫാൻ, ഓഫത്തു തണ്ടുത്ത വൈഴളും തുവുക എന്നിവ അവലുംബിക്കുക. കുടിക്കാനായി ശ്രേസ്, ലൂക്കോസ്, ഒരു ശതമാനം സോഡിയം ബൈ കാർബോൺ എന്നിവ ചേർത്ത വൈഴളും നൽകുക. ചുട്ട കുറഞ്ഞ രാവിലെയും വൈകുന്നേരങ്ങളിലും വിറ്റാമിനുകൾ, ഫോസ്ഫോറസ്, വൈറ്റിനിൾ - സി എന്നിവ സമ്പൂഢിക്കിയ തീറ്റ നൽകുക
പശു	കറവപ്പൾ	അകിടു വികം 	രോഗം വരുന്നത് തടയാനായി പശുകളുടെയും പരിസരങ്ങളുടെയും ശൃംഖലയും എപ്പാഫ്യൂം ഉറപ്പുവരുത്തുക, കറവയന്ത്രംബന്ധാതവണ്ണയും ഉപയോഗിക്കുക. പ്രാണിശല്യം നിയന്ത്രിക്കുക, പശുകൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന ദോണിക്കുകൾ നൽകുക. രോഗപക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള മുഗാശുപത്രിയുമായി എത്തയും പെട്ടു ബന്ധപ്പെടുക. പ്രാരംഭപ്പെട്ടതിൽ തന്ന ചികിത്സ നൽകിയാൽ രോഗം ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാം..

പ്രസ്	ഗർഭകാലം	ബേദ്യസ്ഥാനിന്	പരുക്കിടാങ്ങൾക്കു 4 മാസത്തിനും 8 മാസത്തിനും ഇടയിലുള്ള പ്രായത്തിൽ കുത്തിവെപ്പുകൾ നൽകുക മുഗങ്ങൾക്ക് ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുക. ഗർഭം അലപസിപ്പോകുന്നത് ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള മുഗാശുപ്പത്തിയിൽ അറിയിക്കുകയും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക ബേദ്യസ്ഥാനിന് മനുഷ്യരിലേക്കും പടരുന്നതിനാൽ മുഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നയാൾ നല്ല വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കണം
-------	---------	---------------	---

**മഴ അപായവർണ്ണ സുചന (ദുരന്തനിവാരണത്തിനായ്)

താക്കിൽ (ഇടഞ്ഞപട്ടിയെടുക്കുക)	ജാഗത (തയ്യാറാവുക)	ശ്രദ്ധ (കാത്തോർക്കുക)	നിസ്വാരം (നടപടികൾആവശ്യമില്ല)
----------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------

ഒപ്പ്/-
നോഡൽ ഓഫീസർ
ഗ്രാമീണ കൃഷികാലാവസ്ഥക്കുവും
വിവരങ്ങൾ കുറഞ്ഞാക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നു