

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല വാർത്തകൾ

(ജനുവരി 31–06, 2020)

(തയ്യാറാക്കിയത്: കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെൻ്റർ, മല്ലൂത്തി – 680651

E-mail: cemannuthy@kau.in, Phone: 0487-2370773)

No. C3/4/2020 – 6

Dt. 30 .01. 2020

ഇന്ത്യാധ്യാത്മക വിജ്ഞപ്പിപാലന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

നെല്ലിലെ മുഖ്യമായ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടങ്ങളിലെ വെള്ളം വാർത്ത കളയുക. രണ്ട് ശ്രാം തയാമതോക്സാം പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അല്ലക്കിൽ 3 മില്ലി ഇമിഡാക്ഷോപ്രിഡ് പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക. പുണ്യകൃഷിയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിലം ഒരുക്കൽ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാം. വിതയ്ക്കാനായി പാടം ഒരുത്ത വന്ന ഉച്ചതു നിരത്തിയ ശേഷം വെള്ളം വാർക്കാൻ 2 ആഴ്ച ഇടുക. ഈ സമയത്താണ് കളകൾ മുളയ്ക്കുന്നത്. തുടർന്ന് വീണ്ടും ഉച്ചതുനിരത്തിയ ശേഷം വിതയ്ക്കാം.

തെതെങ്ങുകൾ പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കലാം തരുന്നതിനും പുക്കുലകളിൽ കുടുതൽ പെൺപുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും മച്ചിങ്ങ പൊഴിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും തേങ്ങയുടെ വലിപ്പം കുടുന്നതിനും ജലസേചനം കൂടിയേ തീരു. ഓക്കൽ നന ആരംഭിച്ചാൽ ആ തോട്ടത്തിൽ തുടർന്ന് എല്ലാ വർഷവും നനക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മല്ലിൽ ഇന്ത്പും ഉണ്ടക്കിൽ തെങ്ങ് പോഷകമുലകങ്ങൾ കുടുതൽ കാര്യക്ഷമതയോടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്നതുകൊണ്ട് നനയുള്ള തെങ്ങുകൾക്ക് വളം പല തവണകളായി നൽകാം. ജലസേചന സഹകര്യമില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ തെങ്ങിൻ തോപ്പിലെ ഇന്ത്പും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ കാലവർഷാരംഭത്തോടെ തന്നെ എടുത്തിരിക്കണം. രണ്ടു വരി തെങ്ങുകൾക്കിടയിൽ അര മീറ്റർ ആഴത്തിലും അര മീറ്റർ വീതിയിലും ചാലുകൾ എടുത്ത് അതിൽ അഞ്ചോ ആറോ നിര തൊണ്ട് അടുക്കിയ ശേഷം മല്ലിട്ട് മുടണം. ചകിരിത്തൊണ്ടിന്റെ ഉൾഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരുത്തക്ക വിധമാണ് അടുക്കേണ്ടത്. ഒരു തെങ്ങിന് ഏകദേശം 500 മുതൽ 600 തൊണ്ട് എന്ന തോതിൽ വേണ്ടിവരും. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതു കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം 6 വർഷം വരെ നിർക്കുന്നതായാണ് പഠനങ്ങൾ സുചിപ്പിക്കുന്നത്. തെങ്ങിൽ കൊന്പൻചെല്ലിയുടെ ആക്രമണം കുടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. ഇതിനെ ചെല്ലിക്കൊൽ കൊണ്ട് കൂത്തിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കാം. തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന രോഗമായ ചെന്നീരോലി പ്ലിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നീരോലിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ തൊലി ചെത്തി മാറ്റി കാലിക്കസിൻ അല്ലക്കിൽ കോൺടാഫ് 5 മി.ലി, 100 മി.ലി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചെത്തിയ ഭാഗത്തെ തേക്കുക.

കമുകിന് വളപ്രയോഗം നടത്തേണ്ട സമയമാണിത്. യുറിയ 110 ശ്രാം, രോക്ക് ഫോസ്ഫോറ്റ് 100 ശ്രാം, മൃഗിയേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് 120 ശ്രാം എന്ന തോതിൽ ഏകദേശം 3 വർഷം പ്രായമായ നാടൻ കമുകിനത്തിന് വളപ്രയോഗം നടത്താം. എന്നാൽ ഉൽപ്പാദനശേഷി കുടിയ ഇനമാണെങ്കിൽ 165 ശ്രാം യുറിയ, 150 ശ്രാം രോക്ക് ഫോസ്ഫോറ്റ്, 175 ശ്രാം മൃഗിയേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് എന്ന തോതിൽ വളപ്രയോഗം ചെയ്യണം.

കുരുമുളകിന്റെ കൊടിത്തലബകൾ മുറിച്ചെടുത്ത് വേർ പിടിപ്പിക്കാനായി തവാരണകളിൽ നടേണ്ട സമയമാണിത്. നല്ല വിളവ് തരുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള തായ്വള്ളികളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് മുന്ത് മുട്ടുകളെക്കിലുമുള്ള വള്ളികൾ വേണം തെക്കൾക്ക് വേണ്ടി ശേഖരിക്കാൻ. നടീൽ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുവോൾ സ്വീഡോമോണസ് ചേർക്കുന്നത് തെക്കൾ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതിനും രോഗ പ്രതിരോധശേഷി ലഭിക്കുന്നതിനും സഹായകമാണ്. പെട്ടെന്ന് വേർ പിടിച്ചു കിട്ടുന്നതിനായി ഹോർമോൺ ചികിത്സയും നടത്താം. ഒരു ശ്രാം ഇൻഡോൾ ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ് അൽപ്പം ആർക്കഹോളിൽ ലയിപ്പിച്ച്, വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു ലിറ്ററാക്കുക. തണ്ടുകളുടെ ചുവട്ടറു ഇരു ലായനിയിൽ 45 സെക്കന്റ് സമയം മുക്കിയ ശേഷം നടാം. കമ്പുകൾ 10–15 ദിവസം തണ്ടിൽ വകുക.

പയറിലെ ഇലപ്പോന്നിന്റെ ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കാൻ പാകമായ പയർ വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം 2 മില്ലി പ്രിഫ്രോനിൽ 5SC ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക. പയറിൽ മുണ്ടയുടെ ആക്രമണം കണക്കാൽ 2% വീരുമുള്ള വേപ്പെണ്ണ് എമൾഷൻ തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടീസീലിയം ലെക്കാനി എന്ന മിത്രകുമിൾ 20 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ 10 ദിവസം ഇടവിട്ട് കൊടുക്കുക. രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ 3 മി.ലി ഇമിഡാങ്ക്രോപിഡ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ശ്രാം തയാമെതോക്സാം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക.

തനിവിളയായോ ഇടവിളയായോ ലാഭകരമായി കൂഷി ചെയ്യാൻ യോജിച്ച കിഴങ്ങുവിളയാണ് ചേന. കുംഭം പിറന്നാൽ ചേന നടാം. 90 x 90 സെ.മീ അകലത്തിലും 60 x 60 x 45 സെ.മീ വലുപ്പത്തിലുമുള്ള കുഴികളെടുത്ത് കുമ്മായം ഇടണം ഓഫ്ചു കഴിഞ്ഞ് മേൽമണ്ണും കാലിവളവും ഇലപ്പാടിയും, സ്വീഡോമോണാസും ചേർത്ത് കൂഴി നിറച്ചതിനുശേഷം ചേന നടാം. കൂഴിയെയാന്നിൽ 2 കിലോഗ്രാം ചാണകം ചേർക്കുണം. നടത്തിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ പുതയിടണം.

കുംഭക്കളുടെ സ്ഥലമൊരുക്കാം. അടിവളമായി ചുവടിന് ഒരു കിലോ ശ്രാം വീതം കാലിവളം ചേർക്കണം. കുടാതെ എക്കരിൻ് 22 കി.ഗ്രാം യൂറിയ, 75 കി.ഗ്രാം രോക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ്, 17 കി.ഗ്രാം പൊട്ടാഷ് എന്നിവയും ആവശ്യമാണ്. ശിവരമില്ലാത്ത M4 പോലെയുള്ള ഇനങ്ങൾ 75 x 75 സെ.മീ അകലത്തിലും, ശിവരമുള്ളവ 90 x 90 സെ.മീ അകലത്തിലും നടാം.

ഒഴംഗുമായ ചിറ്റരത്തയുടെ കിഴങ്ക് നട്ട് ഒന്നര വർഷത്തിനുശേഷം വിളവെടുക്കാം. വേരുകൾ നീക്കി വൃത്തിയാക്കിയ കിഴങ്ങുകൾ, പച്ചക്കോ, അരിഞ്ഞുണക്കിയോ വിൽപന നടത്താം. എലി നിയന്ത്രണത്തിനായി പാടത്തെ വരവുകളിലും വീട്ടു പരിസരത്തും ചെത്തിക്കൊടുവേണിക്കിഴങ്ക് നടാം.

അറിയിപ്പ്

- കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ തെത്രമാസിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ കല്പയേന്നുവിന്റെ വരിക്കാരാകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മണ്ണുത്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്റ്രീമായി ബന്ധപ്പെടുക. വാർഷിക വരിസംഖ്യ - 125/രൂപ. അഞ്ചുവർഷത്തെ വരിസംഖ്യ - 500/രൂപ. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ 0487-2370773, 9447838291.

2. കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻ്റർ മല്ലുത്തിയിൽ പച്ച 2020 ഫെബ്രുവരി 6,7 തിയ്യതികളിൽ ശുഖ്യജല മത്സ്യ കൂഷി" എന്ന പിഷയത്തിൽ ദ്വിഭിന്ന പരിഗീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 1050/- രൂപ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം നടത്തുന്ന പരിഗീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ 0487 – 2370773, എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക

രൂപ/-

ചൈപാഫോൺ & ഫോഡ്