

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല വാർത്തകൾ
(ജൂൺ 03 – ജൂൺ 09, 2022)
(തയ്യാറാക്കിയത്: കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻ്റർ, മല്ലുത്തി - 680651
E-mail: cemannuthy@kau.in, Phone: 0487-2370773)

No. C3/4/2022 – 23

Dt. 02.06.2022

ഗ്രാമീൻ കൃഷി മഹസം സേവ - കാർഷിക കാലാവസ്ഥ അറിയിപ്പ്

തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം മെയ് 29ന് കേരള തീരത്തെത്തതി. തെക്കൻ ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ കുറവാണ്. താഴന പ്രദേശങ്ങളിൽ നീർവാർച്ച സാമ്പത്തിക ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതിനാൽ കാർഷിക വിളകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിപാലനം നൽകേണ്ടതാണ്.

ഇന്ത്യാഴ്ചത്തെ വിള പരിപാലന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

നെല്ലിന്റെ വിതരിപ്പു കൃഷിക്കായുള്ള തൊറ് 4-5 ഇല പ്രായത്തിൽ പറിച്ചു നടാം. സ്പുദോമോണാസ് കർച്ചറിന്റെ ലാധനിയിൽ വേർ അരമണിക്കുൻ്ന കുതിർത്ത് നടാൽ പിന്നീട് പോളരോഗം, പോള അഴുകൽ, ഇലപ്പുള്ളി രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കാം. ഇതിന് ഒരു കി.ഗ്രാം വിത്തിന് 10 ഗ്രാം സ്പുദോമോണാസ് കർച്ചർ എന്ന കണക്കിന് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ലാധനി ഉണ്ടാക്കാം.

പച്ചക്കരികൾ നടാനുള്ള സമയമാണിത്. കൃഷികൾ എടുത്ത്, സെൻസാനിന് രണ്ടു കിലോ കുമ്മായം ഇട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പച്ചിലയും കാലിവളവും ചേർക്കണം. ഉദ്ദേശം മുന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തെക്കൾ നടാം. മഴക്കാലത്ത് ഉയർന്ന വാരങ്ങളിലോ കുനകളിലോ വേണം വിത്ത് ഇടേണ്ടതും തെ നടേണ്ടതും. മുളക്, വഴുതന, പച്ചപീര, വൈം തുടങ്ങിയ വിളകൾ വർഷക്കാലത്ത് നടാൻ യോജിച്ചവയാണ്. അടുക്കളേതൊട്ടത്തിൽ ജൈവവളങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണം. സെൻസിന് 100 കി.ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ജൈവവളം വേണ്ടി വരും. കാലിവളം, കണ്വോസ്സ്, മല്ലിരക്കണ്വോസ്സ്, എല്ലപൊടി, പച്ചില, ചാരം, വിവിധതരം പിണ്ണാക്കുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാം. ജൈവവളങ്ങളോടൊപ്പം രാസവളങ്ങളും നൽകാം. സെൻസാനിന് 1 കിലോഗ്രാം യുറിയ, 1.25 കി.ഗ്രാം മസ്സുറി ഫോസ്, 500 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ് ഇവ പല തവണകളായി ചേർത്തുകൊടുക്കാം. നേർവളങ്ങൾക്കു പകരം പച്ചക്കരി വിളകൾക്കായുള്ള മിശ്രിതവും ചേർക്കാം. നെന്ടജൻ വളങ്ങൾ കൂടുതലുപയോഗിക്കുന്നത് രോഗകീടങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും.

ഇടവപ്പാതി തുടങ്ങുന്നതോടെ ഉയർന്ന തവാരണകൾ ഉണ്ടാക്കി വിത്തുതേങ്ങകൾ പാകാം. വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാതിരിക്കാൻ നീർവാർച്ച സാമ്പത്തിക ഉറപ്പുവരുത്തണം. തെങ്ങിലെ കുന്നുചീയൽ രോഗത്തിനു മുൻകരുതലായി സുഷിരങ്ങൾ ഇട്ട് മാങ്കാസെബ് സാഹ്സ 5 ഗ്രാം ഒരു പായ്ക്കറ്റിൽ, 3 എണ്ണം ഒരു തെങ്ങിന്റെ കുന്നിനു ചുറ്റും പയ്ക്കുക.

ബാക്കീരിയ മുലമുണ്ടാകുന്ന വാടരോഗം മഴക്കാലത്ത് ഇണ്ടിയിൽ കണ്ണു വരുന്ന പ്രധാന രോഗമാണ്. ചെടികൾ പെട്ടുന്ന വാടുകയും കടചീയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം. ‘പച്ചവാട്ട്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി

ആദ്യം രോഗം ബാധിച്ചവ പിഴുത് മാറ്റിയശേഷം കുമ്മായം സെന്റ്രൽസീൻ 2.5 കിലോ വീതം ഇടണം എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് 1 കിലോഗ്രാം സ്വീഡമോണാസ് 20 കിലോഗ്രാം ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പോടി അല്ലെങ്കിൽ 20 കിലോ മണലുമായി ചേർത്ത് രോഗം ബാധിച്ച തടങ്ങളിലും അതിനു ശേഷം ചുറ്റുമുള്ള തടങ്ങളിലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം.

കുരുമുളകിലെ ദ്രുതവാട് രോഗത്തിന് മുൻകരുതലായി രണ്ട് കിലോ ദെടക്കേണാശ്രമം, 90 കിലോ ചാണകപ്പോടിയും 10 കിലോ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കുമായി കൂട്ടിക്കലാർത്തി അവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യൻ നിലനിൽക്കത്തക്കവണ്ണം രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് വയ്ക്കുക. പൂപ്പലിന്റെ വളർച്ച കണ്ണടത്തുമേഖല ഇന്ത്യൻ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് 2.5 കിലോ വീതം ഓരോ ചെടിക്ക് ചുവട്ടിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം സ്വീഡമോണാസ് 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 1% വീരുമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം കലക്കി തളിക്കുക.

കമുകിൻ തെക്കൾ ഇന്ത്യൻ മാസത്തിലും നടാം. നല്ല തെരുവെന്തടക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇലകൾ കുടുതലുള്ളതും അധികം പൊക്കം ഇല്ലാത്തതുമായ തെക്കൾ തെരുവെന്തടക്കാൻ. മംഗളം, സുമംഗളം, ശ്രീമംഗളം, മോഹിത് നഗർ എന്നിവ ഉല്പാദനശേഷി കൂടിയ ഇനങ്ങളാണ്. കുമിൾ രോഗത്തിനെതിരെ ഒരു ശതമാനം വീരുമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം പശ ചേർത്ത് തളിച്ചു കൊടുക്കണം. തോട്ടത്തിലെ നീർവാർച്ച മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വാഴകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇലപ്പുള്ളി രോഗം നിയന്ത്രിക്കാനായി രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ വെട്ടി മാറ്റി നശിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരു ശതമാനം വീരുമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം സാൻഡോവിൽ എന്ന പശ രണ്ട് മി.ലി, ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് ഇലയുടെ രണ്ട് വശത്തും വീഴ്ത്തക്കവണ്ണം തളിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ സ്വീഡമോണാസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ പൊടി 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിയ്ക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ രോഗം വരാത്രിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും നല്ലതാണ്.

രൂപം/-

പ്രൊഫസർ & ഹൈസ്