

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല വാർത്തകൾ

(മാർച്ച് 2–8 , 2018)

(തയ്യാറാക്കിയത്: കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്റർ, മല്ലുത്തി – 680651

E-mail: cemannuthy@kau.in, Phone:0487-2370773)

No. C3/4/2018 – 10

Dt. 01 .03.2018

ഇന്ത്യാധ്യാത്മക വിജ്ഞാപന പരിപാലന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

സിലിന് തണ്ടുതുരപ്പൻ, ഓലചുരുട്ടി എന്നിവയുടെ ഉപദേവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ടെക്നോഗ്രാഫ് മുട്ടക്കാർഡുകൾ ഒരേക്കരിൽ 2 എണ്ണം എന്ന കണക്കിന് 20 കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് 5 സെന്റീന് ഒന്ന് വീതം പാടത്ത് നെല്ലോലക്ക് ഭിൽ കെട്ടി വയ്ക്കുക. രണ്ടാധ്യാത്മിലോറിക്കൽ പുതിയ കാർഡുകൾ വെച്ച് നാലഞ്ചു പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുക.

ബാക്കീരിയൽ ഓല കരിച്ചിൽ രോഗം വരാതിരിക്കാനായി സ്വീഡോമോൺസ് ഹജുറസൻസ് എന്ന ബാക്കീരിയപ്പോടി ഒരു കിലോഗ്രാം, 20 കിലോഗ്രാം മണൽ/ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പോടിയുമായി ചേർത്ത് മല്ലിൽ ഇടുകൊടുത്താൽ മതിയാകും.

തെങ്ങിന് നന്ന തുടരാം. വിത്തുതേങ്ങാ സംഭരണവും ഈ മാസത്തിൽ തുടരാം. വിളഞ്ഞ് പാകമായ നാളികേരം മാത്രമേ വിത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാവു. നാളികേരക്കുല ബലമുള്ള കയറിൽ കെട്ടിയിരിക്കണം. ഓരോ കുലയിലേയും ലക്ഷ്യാമാത്രം തേങ്ങ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു മാസം തണലിൽ സൂക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നടാവു.

കവുങ്ങിന് നന്ന തുടരണം. ഇടവിള കൃഷിയിലുടെ കവുങ്ങിന് തോട്ടം കൂടുതൽ ആദായകരമാക്കാം. ജാതി, വാഴ, തീറ്റപ്പുല്ല്, കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, മത്തൻ, ഒറശയ ചെടികൾ എന്നിവ ഇടവിളകൃഷികൾ യോജിച്ചവയാണ്. പ്രധാന വിളക്കൊപ്പം ഇടവിളകൾക്കും വെള്ളവും വളവും നൽകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

പച്ചക്കരി വിളകളിൽ കാണുന്ന ഇലചുരുളൽ, മൊസേകൾ എന്നീ വൈറൽ രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി രോഗം ബാധിച്ച ചെടികൾ അപ്പോഴപ്പോൾ നശിപ്പിക്കുകയും ജൈവകീടനാശിനികൾ തളിച്ച് രോഗം പരത്തുന്ന കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും വേണം. തക്കാളി, വഴുതന, മുളക് മുതലായ വിളകളിൽ ബാക്കീരിയൽ വാട്ടം എന്ന മാരകമായ രോഗം കാണാറുണ്ട്. പുളി രസം കൂടുത ലുള്ള മല്ലിൽ ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക കൂടുതലായിരിക്കും. അതുരം മല്ലിൽ നിലം ഒരുക്കുന്നോൾ തന്നെ 1 സെന്റീന് രണ്ടര കിലോഗ്രാം കു മായം ചേർക്കണം. രോഗസാമ്പത്തിനോടൊപ്പം പോഷകമുലകങ്ങളുടെ ആഗീരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കുമ്മായപ്രയോഗ

ത്തിലുടെ സാധിക്കും. രോഗം ബാധിച്ച് വാടി നിൽക്കുന്ന ചെടികൾ അപ്പോൾ തന്നെ വേരോടെ പിചുത് നശിപ്പിക്കണം. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഈ അർഹ കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് രോഗം ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റാരു പോംവഴി. ശക്തി, മുക്തി, അനുഭവ എന്നീ തക്കാളി ഇനങ്ങളും നീലിമ, ഹരിത, ശ്രവത എന്നീ വഴുതിനയിനങ്ങളും ഉജ്ജവല, അനുഗ്രഹ എന്നീ മുളകിനങ്ങളും ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ്.

തെക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായി കശുമാവ് തോട്ടങ്ങളിൽ പതിവയ്ക്കൽ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ലെയറുകൾ ജുണ്-ജുലായ് മാസങ്ങളിൽ നടാൻ അനുയോജ്യമാണ്.

ഓൺവാഴക്ക് നന്ന തുടരണം. തടതുരപ്പിന്റെ ആക്രമണത്തിനെതിരെ മുൻ കരുതലുകൾ ആയി വാഴത്തടയിൽ ചെളി പുരട്ടലോ, വേപ്പേണ്ണ സോപ്പ് മിശ്രിത പ്രയോഗമോ അനുവർത്തിക്കുക.

ചേന, കാച്ചിൽ തുടങ്ങിയ കിഴങ്ങുവർഗ്ഗ വിളകൾ ഇപ്പോൾ നടാവുന്നതാണ്. വേന്തൽ മഴയോടെയാണ് കാച്ചിൽ നടേണ്ടത്. ശ്രീകീർത്തി, ശ്രീരൂപ എന്നിവ അത്യുല്പാദനശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങളാണ്.

പാഴാക്കി കളയുന്ന കശുമാങ്ങയിൽ നിന്നും സ്ക്കാഷ്ട്, സിറപ്പ്, ജാം തുടങ്ങി വിവിധ ഉല്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. കശുമാങ്ങയുടെ പവർപ്പ് മാറ്റുന്നതിനായി മുത്തുപഴുത്ത കശുമാങ്ങ ശേഖരിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ചാർ പിഡിണ്ടെടുത്തശേഷം ഒരു ലിറ്റർ ചാറിന് 10 ശ്രാം ചാറുവരി കുറുക്കിയതു മായി കൂട്ടിക്കലർത്തി 12 മണിക്കൂർ നേരം വയ്ക്കുക. ഇതിന്റെ തെളിയെടുത്ത സ്ക്കാഷ്ട്, സിറപ്പ് മുതലായവ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്.

അറിയിപ്പ്

1..കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രസിദ്ധീകരണമായ കല്പയെന്നു എന്ന ദൈത്യമാസികയുടെ വരിക്കാരാകാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ മണ്ണുത്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുക.

വരിസംഖ്യാനിരക്ക്:- വാർഷികം 125/--അഞ്ചുവർഷം: 500/രൂപ. ഫോൺ: **0487-2370773, 9605612478, 9447789728.**

2..കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള മണ്ണുത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻ്ററിൽ ചിപ്പി കൂൺ വിത്ത് വിൽക്കപ്പെടുന്നു. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ : **0487-2370773.**

