

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല വാർത്തകൾ

(മാർച്ച് 06 – 12 , 2020)

(തയ്യാറാക്കിയത്: കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെന്റർ, മല്ലൂത്തി – 680651)

E-mail: ccmannuthy@kau.in, Phone:0487-2370773)

No. C3/4/2020 – 11

Dt. 05.03.2020

ഇന്നയാഴ്ചത്തെ വിള പരിപാലന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പുതുക്കുഷിയുള്ള നെൽപാടങ്ങളിൽ തണ്ടുതുരപ്പൻ, ഓലചുരുട്ടി എന്നിവയുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഭടകക്കാഗ്രമം മുടക്കാർധുകൾ ഒരേക്കരിന് 2 എണ്ണം എന്ന കണക്കിന് 20 കഷണങ്ങളാക്കി മുൻ്നിച്ച് 5 സെന്റീന് നീം വീതം പാടത്ത് കെട്ടി വയ്ക്കുക. രണ്ടാഴ്ചയിലോരിക്കൽ പുതിയ കാർഡുകൾ വെച്ച് നാലഞ്ചു പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുക. എതാണ്ട് രണ്ടുമാസം പ്രായമായ ഇടത്തരം മുപ്പുള്ള നെല്ലിനങ്ങൾക്ക് എക്കരിന് 25 കിലോഗ്രാം യുറിയയും 15 കിലോഗ്രാം പൊട്ടാഷും നൽകാവുന്നതാണ്.

ബാക്കീരിയൽ ഓലകരിച്ചിൽ രോഗം വരാതിരിക്കാനായി സ്വീഡോമോസ്സ് ഹജ്രൂറസന്സ് എന്ന ബാക്കീരിയപ്പോടി ഒരു കിലോഗ്രാം, 20 കിലോഗ്രാം ഉണങ്ങിയ ചാണകപ്പോടി അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണുമായി ചേർത്ത് വിതരാവുന്നതാണ്. 20 ഗ്രാം പോടി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തജിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതുമാണ്.

തെങ്ങിന് നന്ന തുടരാം. വിത്തുതേങ്ങാം സംഭരണവും ഈ മാസത്തിൽ തുടരാം. വിളത്ത് പാകമായ നാളികേരം മാത്രമേ വിത്തിനായി ഉപയോഗി ക്കാവു. തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിലെ മണ്ണ് ഉറച്ചതാണെങ്കിൽ വിത്തുതേങ്ങ കുലയോടെ വെട്ടി വീഴ്ത്തരുത്. നാളികേരക്കുല ബലമുള്ള കയറിൽ കെട്ടിയിരക്കണം. ഓരോ കുലയിലേയും ലക്ഷണമൊത്ത തേങ്ങ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു മാസം തണലിൽ സുക്ഷിച്ചിരിന് ശേഷം മാത്രമേ നടാവു.

അന്തരീക്ഷ ഉള്ളഷ്മാവ് കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തടങ്ങളിൽ ഇന്നർപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിനായി പച്ചയോ ഉണങ്ങിയതോ ആയ ചകിരിയിട്ട് മുടുന്നത് നല്ലതാണ്. തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് മുന്ന് മീറ്റർ അകലത്തിൽ വരികൾക്കിടയിൽ ചാലു കീറിയോ, ഓരോ തെങ്ങിന്റെ കടയ്ക്ക് ചുറ്റും തടിയിൽ നിന്നും രണ്ട് മീറ്റർ അകലത്തിൽ വട്ടത്തിൽ ചാലുകൾ എടുത്തോ, അതിൽ ചകിരി നിരത്തിയ ശേഷം മണ്ണിടുമുടാം. ചകിരിയുടെ കുഴിഞ്ഞ ഉശ്രാഗം മുകളിലേയ്ക്ക് വരത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ചകിരി ചാലുകളിൽ അടുക്കേണ്ടത്. ഇതിന് മുകളിൽ മണ്ണിടുമുടണം. ചകിരി അടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം 5-7 വർഷക്കാലം നിലനിൽക്കും. ചകിരിക്കു പകരം ചകിരിച്ചോറ് തെങ്ങാനിന് 25 കി.ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ഓരോ വർഷവും തടത്തിലിട്ടു മുടുന്നതും ഇന്നർപ്പം സംരക്ഷിക്കാൻ ഉതകും.

കവുങ്ങിന് നന്ന തുടരണം. ഇവിള കുഷിയിലും കവുങ്ങിൻ തോട്ടം കൂടുതൽ ആഭായകരമാക്കാം. ജാതി, വാഴ, തീറ്റപ്പുല്ല്, കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, ഏഷ്യ ചെടികൾ എന്നിവ ഇവിളകുഷിക്ക് യോജിച്ചുവയ്ക്കാം. പ്രധാന വിളക്കോപ്പ് ഇവിളകൾക്കും വളവും വെള്ളവും നൽകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

വിഷു വിപണിയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള കണികവെള്ളൽ നടേണ്ട സമയമാണിൽ. കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ മുടിക്കോട് ലോകത്ത് ആൺ യോജിച്ച ഇനം. പാവൽ, പടവലം എന്നിവയിലെ കായീച്ചകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കായീച്ചക്കണി ഫലപ്രദമാണ്. ചെടികൾ പുതതു തുടങ്ങുന്നോൾ മുതൽ കെണി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു കെണി ഉപയോഗിച്ച് 3 മാസത്തേക്കാളം ആൺ ഇനച്ചകളെ ആകർഷിച്ച് നശിപ്പി കാൻ കഴിയും. ഇതോടൊപ്പം പാളയൻ കോടൻ പഴം/തുളസിയിലെ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചിരട്ടക്കണികളും കെട്ടിത്തുകുന്നത് കുടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. ഒരേക്കർ തോട്ടത്തിന് 5 അല്ലെങ്കിൽ 25 സെന്റീമീറ്റർ ഓൺ അമ്ഭവാ ഒരു പുരയിടത്തിന് ഓൺ ക്രമത്തിൽ കെണികൾ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കായീച്ചക്കണി മണ്ണുത്തിയിലെ വിപണന കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. ഫോൺ: 0487-2370540.

വാഴയിൽ ഇലപ്പുള്ളി രോഗം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 20 ശ്രാം സ്വീഡാമോണാൻ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കുളിർക്കേ തളിക്കുക. ഓൺവാഴക് നന തുടരണം. തടതുരപ്പിന്റെ ആക്രമണത്തിനെതിരെ മുൻ കരുതലുകൾ ആയി വാഴത്തടയിൽ ചെളി പുരട്ടലോ, വേപ്പുണ്ണ സോപ്പ് മിശ്രിത പ്രയോഗമോ അനുവർത്തിക്കുക. വാഴയുടെ കടച്ചീയൽ ജലസേചനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്നതിനാൽ സ്റ്റീച്ചിങ്ങ് പാധർ വലിയ കിഴികളാക്കി വെള്ളം തോട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വെയ്ക്കുക. ഈത് വെള്ളത്തിലൂടെ ബാക്കടീരിയയെ നശിപ്പിക്കും. കുടാതെ കോപ്പർ ഓക്സി ക്ഷോഡൈ പൊടി 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 4 ശ്രാം എന്ന കണക്കിൽ ലയിപ്പിച്ച് ലായിനി വാഴയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും നല്കാം.

പച്ചക്കറികളിൽ മന്ധാരി, ഇലപ്പുൻ, വെള്ളീച്ച മുതലായ നീരുറ്റിക്കുടിക്കുന്ന പ്രാണികൾ മുലമുള്ള കുരുട്ടിപ്പുരോഗം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പത്ത് ശ്രാം വെർട്ടിസീലിയം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പുണ്ണയുടുന്ന കീടനാശിനികൾ പത്ത് ദിവസം ഇടവട്ട് തളിക്കുകയോ ചെയ്യുക. ചേന, കാച്ചിൽ തുടങ്ങിയ കിഴങ്ങു വർഗ്ഗ വിളകൾ ഇപ്പോൾ നടാവുന്നതാണ്. വേനൽക്കൂടുതൽ മഴയോടെയാണ് ഇവ നടേണ്ടത്. ശൈക്കീർത്തി, ശൈരൂപ എന്നിവ അത്യുല്പാദന ശേഷിയുള്ള കാച്ചിൽ ഇനങ്ങളാണ്.

വിളകളിലെ കീടനിയന്ത്രണത്തിന് കഴിവതും ജൈവകീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജൈവ കീടനാശിനികൾ തയ്യാറാക്കി അനുതന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നോൾ പുർണ്ണമായ ഫലം കിട്ടുന്നത്. ജൈവകീടനാശിനികൾ ഏത് അനുപാതത്തിൽ തയ്യാറാക്കണമെന്ന ശുപാർശയാണ് സാധാരണ നൽകാറുള്ളത്. ഈത് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോ ദിവസവും ആവശ്യമുള്ള അളവ് മാത്രം തയ്യാറാക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് 5 ലിറ്റർ പുകയിലുകഷായം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് 500 ശ്രാം പുകയിലയും 120 ശ്രാം ബാർസോപ്പും ആവശ്യമാണ്. ഈതേ ലായനി 100 മി.ലി തയ്യാറാക്കാൻ 11 ശ്രാം പുകയിലയും, 3 ശ്രാം ബാർ സോപ്പും മതിയാകും. ഇപ്പോരും തയ്യാറാക്കുന്ന മിശ്രിതം 6-7 ഇട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് വേണം തളിക്കാൻ. വേപ്പുണ്ണ - വെള്ളത്തുള്ളി - സോപ്പ് മിശ്രിതവും പുകയിലുകഷായവും (പുകയിലുകഷായവും ചേർത്ത മിശ്രിതം) തയ്യാറാക്കിയ ഉടൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

അറിയിപ്പ്

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രസിദ്ധീകരണമായ കല്പയേന്നു എന്ന ദ്രോമാസികയുടെ വരിക്കാരാകാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ മന്ത്രത്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക. വരിസംഖ്യാനിരക്ക്: - വാർഷികം 125/- അഞ്ചുവർഷം: 500/രൂപ. ഫോൺ: 04872370773, 9447838291.

ഒപ്പ്
പ്രൊഫസർ & ഹൈസ്