



**കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല**  
**ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റ്**  
**കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, പാലക്കാട്**  
 ഫോൺ: 0466 2212279 ഇമെയിൽ: kvkpalakkad@kau.in  
**കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഉപദേശക ബുള്ളറ്റിൻ**  
**പാലക്കാട് ജില്ല**



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെയും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്റേയും പാലക്കാട് ജില്ല കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്റേയും കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റേയും സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ്. 38/2021 (വെള്ളിയാഴ്ച) തീയതി:14.05.2021

**അടുത്ത 5 ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം**

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	15.05.2021	16.05.2021	17.05.2021	18.05.2021	19.05.2021
മഴ (മില്ലി മീറ്റർ)	90	30	40	20	18
ഉയർന്ന താപനില (°C)	34	34	35	35	35
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	25	25	25	25	25
കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	95	95	95	95	95
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	65	65	65	65	65
കാറ്റിന്റെ വേഗത (കിലോമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ)	6	10	10	10	6
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	290	250	250	250	270
മേഘവ്യാപ്തി (ഒക്ട)	8	8	8	8	8

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവചനമനുസരിച്ചു ജില്ലയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത . കൂടിയ താപനില 35°C വരെയും കുറഞ്ഞ താപനില 25°C വരെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

**പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ:** നടീലിനായി കൃഷിയിടങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ നീർവാർച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക. വരണ്ട അഥവാ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ മാത്രം സ്പ്രേയിങ് ചെയ്യുക. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വെള്ളം പൂർണ്ണമായും വാർത്തുകളഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രം വളങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുക്കുക

**കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ**

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
തെങ്ങ്	വളപ്രയോഗം	<p>തെങ്ങ് ഒന്നിന് 25 കിലോ ജൈവവളം ഓരോവർഷവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം .അമ്ളാംശം കൂടുതൽ ഉള്ള മണ്ണിൽ വളപ്രയോഗത്തിനു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോമൈറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം .ആദ്യ വളപ്രയോഗം ഏപ്രിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ ആണ് നടത്തേണ്ടത് .</p> <p>ഒരു വർഷം പ്രായമായ ഒരു തെങ്ങിന് -യൂറിയ 120 ഗ്രാം ,റോക്ഫോസ്ഫേറ്റ് -197 ഗ്രാം ,മ്യൂറേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് -222 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ കൊടുക്കാം</p> <p>രണ്ട് വർഷം പ്രായമായ തെങ്ങ് ഒന്നിന് - യൂറിയ 241 ഗ്രാം ,റോക്ഫോസ്ഫേറ്റ് -394 ഗ്രാം ,മ്യൂറേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് -445 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ കൊടുക്കാം</p> <p>മൂന്ന് വർഷം മുതലുള്ള തെങ്ങ് ഒന്നിന് - യൂറിയ 360 ഗ്രാം ,റോക്ഫോസ്ഫേറ്റ് -592 ഗ്രാം ,മ്യൂറേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് -668 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ കൊടുക്കാം</p>

	<p>കുന്ദുചീയൽ രോഗം</p>	<p>മഴക്കാലത്തു തെങ്ങിൽ കുന്ദുചീയൽരോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ട്രൈക്കോഡെർമ വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക്കേക്ക് 3 എണ്ണം വീതം കുമ്പോലക്കയ്ച്ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്കവിളുകളിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 3 ഗ്രാം കോപ്പർഓക്സൈഡ് ഓരോലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്നതോതിൽ കലക്കി തളിക്കുക</p>
<p>കന്നുകാലികൾ</p>		<p>കൊതുകു മുട്ട ഇട്ടു പെരുകുന്നത്തടയാൻ തൊഴുത്തും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കാനും, വെള്ളക്കെട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ചാണക കുഴികളിൽ മഴ നേരിട്ടുപിഴാതെ മുടി വയ്ക്കുക</p>
<p>കോഴി</p>		<p>മഴക്കാലത്തു താരതമ്യേന പകൽ വെളിച്ചം കുറവായതു കൊണ്ട് മുട്ടകോഴികളിൽ മുട്ട ഉത്പാദനം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആയതിനാൽ, വെളിച്ചത്തിനായി ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ലൈറ്റുകൾ ഇട്ടു ദിവസവും 16 മണിക്കൂർ എന്നതോതിൽ വെളിച്ചം നൽകണം</p>