



## Agromet Advisory Bulletin

Date : 26-05-2020

Weather Forecast of PALAKKAD(Kerala) Issued On : 2020-05-26(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-05-27	10.0	38.0	27.0	85	52	10.0	250	7
2020-05-28	15.0	38.0	27.0	85	52	8.0	250	8
2020-05-29	9.0	38.0	27.0	85	52	12.0	270	8
2020-05-30	5.0	38.0	27.0	85	52	10.0	270	7
2020-05-31	18.0	38.0	27.0	85	52	8.0	250	8

### Weather Summary/Alert:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Light rainfall is expected in some parts of the district</li> <li>• ജില്ലയിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ നേരിയ തോതിലുള്ള മഴയ്ക്ക് സാധ്യത</li> </ul>
---

### General Advisory:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make the land free from weeds, dried leaves and diseased plants to avoid the attack of pests and disease before the monsoon.</li> <li>• രോഗങ്ങളുടെയും കീടങ്ങളുടെയും ആക്രമണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കാലവർഷത്തിനു മുൻപ് തന്നെ കളകളും ഉണങ്ങിയതും രോഗം ബാധിച്ചതുമായ ചെടികളും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.</li> </ul>
--

### SMS Advisory:

-
-

### Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
BLACK PEPPER	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trichoderma (Trichoderma multiplied in cow dung neem cake mixture) should be applied in the basins @ 5kg / vine to reduce quick wilt incidence.</li> <li>• ദ്രുതവാട്ടം തടയുന്നതിനായി ചാണകവും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും ചേർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ വളർത്തിയെടുത്ത ട്രൈക്കോഡർമ ഒരു മുടിന് 5 kg എന്ന കണക്കിൽ തടത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുക.</li> </ul>
COCONUT	

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
	<ul style="list-style-type: none"> <li>It is better to plant coconut seedlings at those places where enough rainfall is received. Put top soil up to 60cm in the pit and two layers of husk burial in the pit will ensure enough moisture content for the seedlings.</li> <li>നന്നായി മഴ ലഭിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ തെങ്ങിൻ തൈകൾ നടുന്നതിനുള്ള സമയമാണിത്. നടാനുള്ള കുഴികളിൽ 60 സെ. മീ. വരെ മേൽ മണ്ണ് ഇടുക. ഒപ്പം രണ്ടു വരി തൊണ്ട് കുഴികളിൽ അടുക്കുന്നത് തൈകൾക്ക് വേണ്ട ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.</li> </ul>
BANANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Against pseudostem weevil attack spray Nanma 5% at 50ml per liter covering the whole plant when the plant attains 4-5 months after planting. Before spraying, clean the plant by removing dried and drooping leaves. If the infestation is noticed, inject Menma at 5ml per injection at three locations around the infestation point.</li> <li>പിണ്ടിപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം തടയുന്നതിനായി 4 മുതൽ 5 മാസം പ്രായമായ വാഴകളിൽ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്തതിനു ശേഷം 5% നന്മ, 50 ml ഒരു ലിറ്റർ എന്ന തോതിൽ ഇലകളിലും പിണ്ടിയിലും മുഴുവനായി തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വണ്ടുകളുടെ ആക്രമണം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മേന്മ 5 ml വീതം പിണ്ടിയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിനു ചുറ്റുമായി മൂന്നു ഭാഗങ്ങളിൽ കുത്തി വക്കുക.</li> </ul>

**Livestock Specific Advisory:**

Livestock(Varieties)	Livestock Specific Advisory
COW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feed sacs should be placed on the top of wooden planks or iron stands instead of placing along the wall. Increased moisture content in the feed will lead to severe fungal toxicity to the cattle.</li> <li>തീറ്റ ചാക്കുകൾ ചുമരിൽ ചാരി വക്കാതെ മരപ്പലകയുടെയോ ഇരുമ്പ് പലകയുടെയോ മുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുക. തീറ്റയിൽ ഈർപ്പം കലർന്നാൽ അത് മാരകമായ പൂപ്പൽ വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകും.</li> </ul>