



Gramin Krishi Mausam Sewa
 India Meteorological Department
 Kerala Agricultural University
 Vellanikkara, Thrissur, Kerala



Agromet Advisory Bulletin

Date : 30-06-2020

Weather Forecast of PALAKKAD(Kerala) Issued On : 2020-06-30(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-07-01	2.0	31.0	24.0	95	78	10.0	250	8
2020-07-02	8.0	31.0	24.0	95	78	10.0	250	8
2020-07-03	10.0	31.0	24.0	95	78	10.0	270	8
2020-07-04	10.0	31.0	24.0	95	78	12.0	270	8
2020-07-05	12.0	31.0	24.0	95	78	10.0	270	8

Weather Summary/Alert:

- Comparatively light rainfall is expected for coming days in the district.
- ജില്ലയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ താരതമ്യേന നേരിയ തോതിലുള്ള മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.

General Advisory:

- As a prophylactic measure of leaf spot disease in banana, spray 20g/L pseudomonas by covering the whole plant.
- വാഴയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇലപ്പുള്ളി രോഗത്തിന് എതിരായി 20 ഗ്രാം സ്യൂഡോമൊണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ വാഴ മൊത്തമായി തളിച്ച് കൊടുക്കുക.

SMS Advisory:

-

-

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
RICE	<ul style="list-style-type: none"> • If the bacterial leaf blight disease is noticed in the main field after transplanting, put small pouch of bleaching powder at 2kg per acre in the main field water. • ഞാറു പറിച്ച് നട്ടതിനു ശേഷം നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ ബാക്റ്റീരിയൽ ഓലകരിച്ചിൽ രോഗം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഒരു ഏക്കറിന് 2 കിലോഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കിഴികെട്ടി പാടത്തെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുക.

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory

Horticulture (Varieties)	Horticulture Specific Advisory
BRINJAL	<p>• Apply 170g urea and 80g potash for each cent as top dressing for the solanaceous crops (Brinjal, tomato and chilli) one month after transplanting.</p> <p>• വഴുതന വർഗ്ഗ വിളകളിൽ (വഴുതനം, തക്കാളി, മുളക്) നട്ടു ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം ഒരു സെന്റിന് 170 ഗ്രാം യൂറിയ, 80 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ് എന്നിവ മേൽവളമായി നൽകാവുന്നതാണ്.</p>
BLACK PEPPER	<p>• Apply Trichoderma multiplied in cow dung – neem cake mixture at 5kg per vine in the basins of black pepper to reduce the quick wilt disease of pepper. For preparing this, mix 1-2 kg Trichoderma, 90 kg cow dung and 10 kg neem cake. Sprinkle some water over it and mix it again thoroughly. Make small heaps of this mixture in areas with proper shade and cover it with polythene sheets. After one week, again mix it after sprinkling water. Cover again with polythene sheets for one more week. Finally this can be used for field application.</p> <p>• കുരുമുളകിൽ ദ്രുതവാട്ടരോഗത്തിനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ചാണകവും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും ഇളക്കി ചേർത്ത് ട്രൈക്കോഡെർമ വളർത്തിയെടുത്ത മിശ്രിതം ഒരു മുടിന് 5 കി. ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുക. ഇതിനായി 1-2 കിലോഗ്രാം ട്രൈക്കോഡെർമ, 90 കിലോഗ്രാം ചാണകപ്പൊടി, 10 കിലോഗ്രാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇവയുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തി വെള്ളം തളിച്ച് ഇളക്കി തണലുള്ള സ്ഥലത്തു ചെറു കുനയാക്കി പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മുടിയിടുക. ഒരാഴ്ച ശേഷം ഈ മിശ്രിതം വീണ്ടും ഇളക്കി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം തളിച്ച് കുനയാക്കി ഒരാഴ്ച കൂടി മുടിയിടുക. ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ട്രൈക്കോഡെർമ വിറിയെ മിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.</p>