

പ്രകൃതിയുടെ വരദാനമായ വാഴക്കളം പൈനാപ്പിൾ

ആസ്വദിക്കുക, കൃഷി ചെയ്യുക

ഉന്മേഷത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും



Food Value/100 g Edible Portion

Moisture	- 85.3 g
Energy	- 52 Calories
Carbohydrates	- 13.7 g
Ether Extract	- 0.19 g
Nitrogen	- 0.086 g
Protein	- 0.54 g
Dietary Fibre	- 1.4 g
Ash	- 0.39 g
Potassium	- 150 mg
Calcium	- 16 mg
Magnesium	- 12 mg
Phosphorus	- 11 mg
Iron	- 0.28 mg
Zinc	- 0.10 mg
Vitamin A	- 130 I.U.
Vitamin B1	- 0.079 mg
Vitamin B2	- 0.031 mg
Vitamin B3	- 0.489 mg
Vitamin B6	- 0.110 mg
Vitamin C	- 24 mg

- ഊഷ്മളമായ മണവും, രുചിയും, ആരോഗ്യദായകവും
- പഴത്തിനും ജൂസിനും കാനിങ്ങിനും ഉത്തമം
- രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കൂട്ടി ഊർജ്ജം നൽകുന്നു
- എല്ലുകളെയും പല്ലുകളെയും ബലപ്പെടുത്തുന്നു
- ദഹനത്തിനു സഹായിക്കുന്നു
- രോഗപ്രതിരോധശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു
- ജലദോഷവും ചുമയും കുറയ്ക്കുന്നു
- മലബന്ധം തടയുന്നു, കാഴ്ചശക്തി കൂട്ടുന്നു
- വൃക്ക രോഗങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നു
- ശിശുക്കളിൽ ശർദ്ദി, വിരശല്യം കുറയ്ക്കുന്നു
- അനേകം കൊതിയുറും വിഭവങ്ങളും ഉൽപന്നങ്ങളും
- ബ്രോമിലൈൻ, ഫൈബർ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു

പൈനാപ്പിളിന്റെ വലുപ്പമനുസരിച്ചുള്ള A, B, C ഗ്രേഡിംഗ് മൂലം ഓരോ ഗ്രേഡ് കുറയുമ്പോഴും വില പകുതിയായി കുറയുന്നു. സുസ്ഥിര ആദായത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ A ചക്ക വിളയിക്കണം.

കൂടുതൽ A ചക്ക വിളയിപ്പിക്കാനും സുസ്ഥിര ആദായത്തിനും

- ഭൂസൂചികയുള്ള വാഴക്കളം പൈനാപ്പിൾ (മൗറിഷ്യസ്) ഇനം കൃഷി ചെയ്യുക
 - നല്ലനീർവാർച്ചയുള്ളതും, അൽപം അമ്ലതയും, നല്ല ജൈവവളകുറുള്ളതുമായ മണൽ കലർന്ന മണ്ണ്
 - നല്ല വിളവിന് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം വേണം, വേനൽക്കാലത്ത് മൂന്ന് ആഴ്ചകൂടുമ്പോൾ നനച്ചുകൊടുക്കുക
 - കീടരോഗബാധയില്ലാത്ത ആരോഗ്യമുള്ള ഒന്നാം വർഷ കാനികൾ നടണം.
 - ട്രൈക്കോഡെർമ, സ്യൂഡോമൊണാസ്, വെർട്ടിസില്ലിയം (20 g/l) മുതലായവ പ്രയോഗിക്കണം
 - ശരിയായ വിളസാന്ദ്രത പാലിക്കുക (ഹെക്ടറിന് തന്നിവിളക്ക് 40000, ഇടവിളക്ക് 20000 കാനികൾ)
 - സംയോചിത വളപ്രയോഗക്രമം പാലിക്കുക (കാനി ഒന്നിന്: ജൈവ വളം 1 കി.ഗ്രാം, NPK 8:4:8 ഗ്രാം; ഹെക്ടറിന്: ജൈവ വളം 25 ടൺ, NPK 320:160:320 കി.ഗ്രാം, 3-4 തവണകളായി)
 - തണ്ടുപൊട്ടൽ ഒഴിവാക്കാൻ പൈനാപ്പിൾ പുഷ്പിക്കുന്ന സമയത്തും അമിതമായും വളപ്രയോഗം അരുത്.
 - കുറ്റിവിളക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാനി മാത്രം നില നിർത്തി ബാക്കിയുള്ളവ അടർത്തി മാറ്റണം
 - കളകളെ മുളയിലേ നിയന്ത്രിക്കുക (ഹെക്ടറിന് 3 കി.ഗ്രാം ഡൈയൂറോൺ (ക്ലാസ്സ്) 600 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ)
 - പുഷ്പിക്കാൻ 25 ppm എഥിഫോൺ 50 ml 40-ഇല പരുവത്തിൽ (നട്ട് 7-8 മാസത്തിൽ) കുമ്പിൾ ഒഴിക്കുക (1000 ചെടികൾക്ക് 50 l വെള്ളം + 3.2 ml എത്രൽ 39% + 1 kg യൂറിയ + 20 g കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്)
 - സൂര്യഘാതം തടയാൻ ചക്കയുടെ മേൽ ചപ്പുചവറുകൾ ഇടുകയോ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടുകയോ ചെയ്യുക
 - രോഗം പരത്തുന്ന കീടങ്ങളേയും കളകളേയും നിയന്ത്രിക്കുക; രോഗം ബാധിച്ച ചെടികളെ നശിപ്പിക്കുക
 - തുടക്കത്തിലേയുള്ള കീടരോഗ നിർണ്ണയം, നിയന്ത്രണം, ശുപാർശയനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നു പ്രയോഗം
- മീലീമുട്ടക്: ക്ലോർപൈറിഫോസ് (ഹിൽബാൻ 20EC 2.5 ml/l), ഇമിഡാക്ലോപ്രിഡ് (ടാറ്റാമിഡ 200 SL 0.3 ml/l), കിനാൽഫോസ് (ഇക്കാലക്സ് 25EC 2 ml/l)
 ചീയലിന്: മാങ്കോസെബ് (ഇൻഡോഫിൽ 75WP 3 g/l, സാഫ് 2 g/l), ഹെക്സാകൊണാസോൾ (കോഫ് 5SC 2 ml/l; സമർബ് 2SC 4 ml/l) 500 l/ha



കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: പൈനാപ്പിൾ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല) വാഴക്കളം, മുവാറ്റുപുഴ, എറണാകുളം ജില്ല, കേരളം, പിൻ-686 670, ഫോൺ : 0485 2260832
 ഇമെയിൽ: prsvkm@kau.in, വെബ് സൈറ്റ്: prsvkm.kau.in, kau.edu/prsvkm, prsvkm.tripod.com